



د افغانستان اسلامي امارت
د علومو اکاډمي
د طبیعي-تخنیکي علومو د برخې معاونیت
د کیمیا، بیولوژي او کرنې علومو مرکز



علمي - څېړنیز کنفرانس

په لغمان ولایت کې د غنمو د ژمنیو، اختیاري او ځینو محلي ورايتي
گانو د ودې او حاصلاتو پرتلیزه څېړنه

وړاندې کوونکی: څېړندوی محمد منیر نظیري



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين

لنډيز

☐ سريزه

☐ د موضوع په اړه تېري څېړنې (literature review)

☐ د څېړنې کال: 1403 هـ.ل

☐ د څېړنې ځای: لغمان ولايت، قرغيو ولسوالۍ (بزرگر کرونده)

☐ د غنمو جينوتايپونه: 12 (يوه ژمنۍ، 9 اختياري، دوه محلي ژمنۍ ورايتي گانې).

☐ د څېړنې په جريان کې ترسره شوي مشاهدات: د جرمنېشن سلنه، 50 سلنه Heading پورې د ورځو شمېر، 50 سلنه گل نيونې پورې د ورځو شمېر، په بوټي کې د ټيلرونو شمېر، د بوټو قدونه، د وېرو اوږدوالی، تر پخېدو پورې د ورځو شمېر، بيولوژيکي وزن، د وېري وزن، په وېري کې د دانو شمېر، د 1000 دانو وزن، د حاصلاتو کچه او هارويست انډکس سلنه.

☐ د څېړنې اقتصادي اغېزمنتيا

☐ پايلي او وړانديزونه

سریزه

غنم (*Triticum aestivum* L.) چې د هېواد اصلي خواړه شمېرل کېږي، په کور دننه یې حاصلاتو لوړوالی ډېره مېرمه او بېړنۍ اړتیا گڼل کېږي.

د کرنیزو محصولاتو د تولید مهم اړخونه:

❖ باثباته؛

❖ ښه کیفیت؛

❖ ډېر حاصل.


دا هغه عوامل دي چې غذايي امنیت تضمینوي، هېواد د کورني تولید له اړخه په ځان بسیا کوي او د صادراتو پوتنشل لوړوي.

دې موخې ته د رسېدو لپاره اړینه ده چې:

- په مناسب وخت د لوړ حاصل ورکونکې او ښه کیفیت درلودونکې ورايتي گانې وکرل شي؛
- هغه ورايتي گانې وکرل شي چې د سيمي د خاورې او اقليمي شرایطو سره ښه توافق ولري؛
- هغه ورايتي گانې وکرل شي چې د ناروغیو، آفتونو، وچکالۍ، یخنۍ او گرمۍ پر وړاندې مقاومت لري.

ادامه ...

د کلونو په تفکیک سره د غنمو نړۍ وال تولید



ادامہ ...

پہ بھرنیو ہېوادونو کې د غنمو تولید ټن/هکتار (2022 – 2023)

8.33 - UK ➤

5.44 - مکسیکو ➤

3.56 - کاناډا ➤

3.38 - ایتوپیا ➤

3.06 - پاکستان ➤

1.79 - ناچریا ➤

1.67 - کولمبیا ➤

8.32 - جرمني ➤

3.52 - هندوستان ➤



په افغانستان کې د غنمو تولید

د غنمو کلني تولید په منځني توگه **3.5 - 4** میلیون متریک ټنه .

په 1403 هجري لمریز کال کې :

■ د غنمو تر کښت لاندې ساحه **2.12** میلیون هکتار ؛

■ **1.3** میلیون هکتاره د اوبه خور په بڼه او **736** زره هکتار په للمي توگه ؛

■ د اوبه خور په بڼه د کرل شوې ځمکې څخه په منځي ډول **2.37** ټنه غنم ترلاسه شوي دي ؛

■ د للمي ځمکې له هر هکتار څخه ل **0.6 - 0.9** ټنه پورې غنم ترلاسه شوي دي .

غنمو ته د هېوال کلنۍ اړتیا شاوخوا **7** میلیون ټنه دی .



د خېړنې موخه: د لغمان ولايت خاورې او اقليمي شرايطو لپاره د غنمو د لوړ حاصله، د ناروغيو او آفتونو پر وړاندې د ځواکمنو او مناسبو ورايتي گانو ټاکل.

د خېړنې پوښتنه: په لغمان ولايت په اقليمي شرايطو کې د غنمو کومې ورايتي گانې لوړ حاصل ورکونکې دي؟

د خېړنې اهميت: زموږ د هېواد په شرايطو کې ډېره بېړنۍ اړتيا ده چې وگړي د غنمو له اړخه د غنمو د کورني توليد پر بنسټ په ځان بسيا شي.

د خېړنې مېرْميت: دا چې غنم د هېواد د وگړو اساسي خواړه بلل کېږي، اړينه ده چې د غنمو هغه لوړ حاصل ورکونکي ډولونه د کښت لپاره وټاکل شي چې د غلې-داني ښه کيفيت ولري او د اقليمي شرايطو پر وړاندې ځواکمن او زموږ د هېواد د خاورې او اقليمي شرايطو لپاره مناسب وي.

شاليد (د موضوع په اړه مخکنۍ څېړنې)

لومړۍ جدول - په 2024 کال کې د Sotvoldi Tursunov او د هغه د ملگرو په ترکمنستان:



ورایتي گانې			شاخصونه
Tanya	Kroshka	Chillaki	
736	749	722	په متر مربع کې د تولیدي ټیلرونو شمېر
97.5	96.4	90.2	د بوټي لوړوالی / سانتي متر
8.9	9.3	8.6	د وړي اوږدوالی / سانتي متر
41.3	43.2	39.3	په یوه وړي کې د دانو شمېر
41.2	42.6	39.8	د 1000 دانو وزن / گرام
6.08	6.28	5.66	حاصل ټن/هکتار

دویم جدول - په 2004 او 2005 کلونو کې د Georg Drezner او ملگرو له لورې یې په کرواسیا:




پارامترونه			تریټمنټونه
حاصل ټن/هکتار	گلوتین سلنه	پروتین سلنه	
7.927	34.2	14.2	Seva
7.925	31.5	13.3	Demetra
7.679	31.9	13.7	Srpanjika
7.605	34	14.2	Panonka
7.523	33	13.6	Super Zitarka
7.205	37.2	14.5	Golubica
7.193	35.6	14.4	Zitarka
7.993	36.7	14.3	Osijek
7.942	36.2	15.1	Nova Gradiska
7.676	35.1	13.9	Tovarnik
6.707	28.2	12.7	Pozega
7.658	35.3	14.1	2004
7.500	32.8	13.9	2005

جینوتاپیونه

موقعیتونه

کالونه

د څېړنې میتود



❖ د څېړنیزې تجربې د کرلو وخت: 30، قوس، 1403 کال

❖ د څېړنې ځای: لغمان ولایت، قرغیو ولسوالي

❖ د څېړنې ډول: ساحوي (Field Experiment)

❖ د څېړنې میتود: بشپړ ډول تصادفي ډیزاین شوي بلاکونه (RCBD)

❖ د تریتیمونو شمېر: 12

❖ د تکرارونو شمېر: 3

❖ د پلاتونو شمېر: 36

❖ د څېړنې ټوله ساحه (Gross Area): 190 متر مربع

❖ د څېړنې خالصه ساحه (Net Area): 126 متر مربع

❖ د څېړنیزو پلاتونو پراخوالی 150X260 سانتي متر مربع

❖ د پلاتونو خالصه ساحه (Net Area): 3.5 متر مربع

❖ په پلاټ کې د تخم اندازه: 40 گرامه

❖ په هکتار کې د تخمیز اندازه: 114 کیلو گرامه

❖ په تجربه کې د غنمو 12 ورايتي گانې شاملې وې.

د خپرنې شرايط

- ❖ د خپرنې منطقه د طول البلد په 70 درجو 23 دقيقو 33 ثانيو او عرض البلد 34 درجو 51 دقيقو او 85 ثانيو کې واقع ده.
- ❖ د بحر له سطحې څخه لوړوالی: 629 متره.
- ❖ د کلنۍ د تودوخې منځنۍ حد: 21.09 درجې د سانتي گراد.
- ❖ د کلني اوربنت کچه: په منځني ډول 367 ملي متره.
- ❖ کلني نسبتي لنډه بل: په منځنۍ توگه 34.53 سلنه بنودل شوی دی.

د تجربې نقشه (Layout)

لومړۍ تکرار		دویم تکرار		درېیم تکرار	
پلاټ نمبر	تربیمنټ	پلاټ نمبر	تربیمنټ	پلاټ نمبر	تربیمنټ
1	جوزجان 20 (اختیاري)	24	محلي 1 (ژمنی)	25	دایمه 17 (اختیاري)
2	ډیورم 18 (اختیاري)	23	شمال 17 (اختیاري)	26	محلي (ژمنی)
3	شرق 19 (اختیاري)	22	دایمه 17 (اختیاري)	27	صلح 18 کنترول (ژمنی)
4	دایمه 17 (اختیاري)	21	شرق 19 (اختیاري)	28	محلي 1 (ژمنی)
5	گرمسیر 18 (اختیاري)	20	جوزجان 20 (اختیاري)	29	ډیورم 18 (اختیاري)
6	محلي (ژمنی)	19	پکتیا 20 (اختیاري)	30	کندر 20 (اختیاري)
7	شمال 17 (اختیاري)	18	ډیورم 18 (اختیاري)	31	شرق 19 (اختیاري)
8	نصرت 22 (اختیاري)	17	نصرت 22 (اختیاري)	32	جوزجان 20 (اختیاري)
9	صلح 18 کنترول (ژمنی)	16	گرمسیر 18 (اختیاري)	33	نصرت 22 (اختیاري)
10	پکتیا 20 (اختیاري)	15	کندر 20 (اختیاري)	34	شمال 17 (اختیاري)
11	کندر 20 (اختیاري)	14	محلي (ژمنی)	35	پکتیا 20 (اختیاري)
12	محلي 1 (ژمنی)	13	صلح 18 کنترول (ژمنی)	36	گرمسیر 18 (اختیاري)



درېم جدول - د جینوټایپونو د جرمنېشن سلنه



د کنټرول سره یې توپیر	منځنۍ سلنه	د تبغ وهنې سلنه			تربیمنت
		درېم تکرار	دویم تکرار	لومړی تکرار	
3.7	87	98	80	83	جوزجان 20 (اختیاري)
1.7	85	73	97	85	ډیورم 18 (اختیاري)
14	97.3	97	98	97	شرق 19 (اختیاري)
11.3	94.6	94	93	97	دایمه 17 (اختیاري)
-15.7	67.6	62	56	85	گرمسیر 18 (اختیاري)
-13	70.3	65	65	81	محلي (ژمنۍ)
4.7	88	96	73	95	شمال 17 (اختیاري)
8.7	92	97	82	97	نصرت 22 (اختیاري)
-	83.3	87	83	80	صلح 18 کنټرول (ژمنۍ)
11	94.3	89	98	96	پکتیا 20 (اختیاري)
11.3	94.6	98	94	92	کنر 20 (اختیاري)
-6.7	76.6	87	78	65	محلي 1 (ژمنۍ)
-	85.29				Grand mean
-	3.63				CV %
-	4.36				LSD _{0.05}

پرتله شوي جینوټایپونه	توپیر (سلنه)	د پام وړ توپیر
شرق 19 X گرمسیر 18	29.70	شته
شرق 19 X محلي	27	شته
دایمه 17 X گرمسیر 18	27	شته
کنر 20 X محلي	24.30	شته
نصرت 22 X گرمسیر 18	20.24	شته
جوزجان 20 X ډیورم 18	2	نشته
محلي X محلي 1	- 6.30	شته

څلورم جدول - تر 50 سلنه Heading پورې د ورځو شمېر (له ودیز پړاو څخه تڅږي ته)



د کنټرول سره یې توپیر	منځنۍ	د په غلاف کې د وږي د ډډېدو ورځې			تړتیمېنټ
		لومړۍ تکرار	دویم تکرار	درېیم تکرار	
-9.7	96.3	97	95	97	جوزجان 20 (اختیاري)
-8	98	95	96	103	ډیورم 18 (اختیاري)
-10	96	97	95	96	شرق 19 (اختیاري)
-10	96	95	96	97	دایمه 17 (اختیاري)
-10.7	95.3	95	95	96	گرمسیر 18 (اختیاري)
-9.7	96.3	98	96	95	محلي (ژمنۍ)
-10.4	95.6	95	97	95	شمال 17 (اختیاري)
-9.4	96.6	95	99	96	نصرت 22 (اختیاري)
-	106	106	106	106	صلح 18 کنټرول (ژمنۍ)
-10.4	95.6	96	96	95	پکتیا 20 (اختیاري)
-9.7	96.3	96	96	97	کنر 20 (اختیاري)
-10.4	95.6	96	95	96	محلي 1 (ژمنۍ)
-	96.7				Grand mean
-	1.32				CV %
-	2				LSD _{0.05}

د پام وړ توپیر	توپیر (ورځې)	پرتله شوي جینوټایپونه
شته	10.4	صلح 18 X شمال 17
شته	10.7	صلح 18 X گرمسیر 18
شته	9.4	صلح 18 X نصرت 22
شته	10.4	صلح 18 X محلي 1
شته	2.7	ډیورم 18 X گرمسیر 18
شته	- 10	شرق 19 X صلح 18
شته	- 9.7	جوزجان 20 X صلح 18
شته	- 10	دایمه 17 X صلح 18

پنځم جدول - تر 50% Flowering پورې د ورځو شمېر (Reproductive stage)



تريټمنټ	تر 50 سلنه گل نيونې ورځې			منځنۍ	د کنټرول سره يې توپير
	لومړۍ تکرار	دویم تکرار	درېیم تکرار		
جوزجان 20 (اختياري)	108	105	103	105.3	-5.7
ډيورم 18 (اختياري)	108	107	104	106.3	-4.7
شرق 19 (اختياري)	105	102	107	104.6	-6.4
دايمه 17 (اختياري)	106	103	101	103.3	-7.7
گرمسير 18 (اختياري)	105	101	100	102	-9
محلي (ژمنۍ)	103	104	106	104.3	-6.7
شمال 17 (اختياري)	103	100	103	102	-9
نصرت 22 (اختياري)	103	104	105	104	-7
صلح 18 کنټرول (ژمنۍ)	111	111	111	111	-
پکتيا 20 (اختياري)	102	101	100	101	-10
کنر 20 (اختياري)	103	103	101	102.3	-8.7
محلي 1 (ژمنۍ)	101	101	101	101	-10
Grand mean				103.4	-
CV %				1.16	-
LSD _{0.05}				1.92	-

پرتله شوي جينوتايبونه	توپير (سلنه)	د پام وړ توپير
صلح 18 X جوزجان 20	5.7	شته
صلح 18 X دايمه 17	7.7	شته
صلح 18 X محلي 1	10	شته
صلح 18 X گرمسير 18	9	شته
ډيورم 18 X پکتيا 20	5.3	شته
شرق 19 X صلح 18	- 6.4	شته
دايمه 17 X گرمسير 18	1.3	نشته
کنر 20 X محلي	- 2	نشته

شپږم جدول - په بوټي کې د ټیلرونو شمېر (له یو واحد نبات څخه څو نورې ساقي تولیدوي)



تریتمنټ	په بوټي کې د ټیلرونو شمېر			منځنۍ	د کنټرول سره یې توپیر
	لومړۍ تکرار	دویم تکرار	درېیم تکرار		
جوزجان 20 (اختیاري)	8	10	11	10	1
ډیورم 18 (اختیاري)	9	12	11	11	2
شرق 19 (اختیاري)	9	10	7	9	0
دایمه 17 (اختیاري)	8	9	9	9	0
گرمسیر 18 (اختیاري)	8	12	13	11	2
محلي (ژمنۍ)	6	8	9	8	-1
شمال 17 (اختیاري)	12	14	13	13	4
نصرت 22 (اختیاري)	12	9	12	11	2
صلح 18 کنټرول (ژمنۍ)	7	11	9	9	-
پکتیا 20 (اختیاري)	10	13	15	13	4
کنر 20 (اختیاري)	12	9	12	11	2
محلي 1 (ژمنۍ)	6	7	8	7	-2
Grand mean				10.25	-
CV %				6.96	-
LSD _{0.05}				1.41	-

د پام وړ توپیر	توپیر (دانه)	پرتله شوي جینوټایپونه
شته	6	شمال 17 X محلي 1
شته	6	پکتیا 20 X محلي 1
شته	- 5	محلي 17 X شمال 17
شته	2	دایمه 17 X محلي 1
شته	4	گرمسیر 18 X محلي 1
شته	- 4	شرق 19 X شمال 17

اووم جدول - د غنمو د بوټو قدونه



د پام وړ توپیر	توپیر (سانتي متر)	پرتله شوي جينوتايپونه
شته	30	کنډ 20 X محلي
شته	24.7	کنډ 20 X محلي 1
شته	23.4	کنډ 20 X گرمسير 18
شته	22.4	کنډ 20 X شرق 19
شته	21	کنډ 20 X شمال 17
شته	20.7	کنډ 20 X صلح 18
شته	20.3	پکتيا 20 X محلي
شته	15	پکتيا 20 X محلي 1
شته	14.3	ډيورم 18 X محلي

د کنترول سره يې توپير	منځنۍ	د بوټي قدونه			تريټمنټ
		درېيم تکرار	دويم تکرار	لومړی تکرار	
7.3	94.6	95	101	88	جوزجان 20 (اختياري)
5	92.3	88	98	91	ډيورم 18 (اختياري)
-1.7	85.6	88	87	82	شرق 19 (اختياري)
3.3	90.6	93	83	96	دايمه 17 (اختياري)
-2.4	84.6	88	81	85	گرمسير 18 (اختياري)
-9.3	78	76	82	76	محلي (ژمنۍ)
-0.3	87	95	88	78	شمال 17 (اختياري)
5	92.3	97	96	84	نصرت 22 (اختياري)
-	87.3	92	82	88	صلح 18 کنترول (ژمنۍ)
11	98.3	102	102	91	پکتيا 20 (اختياري)
20.7	108	113	105	106	کنډ 20 (اختياري)
-4	83.3	82	82	86	محلي 1 (ژمنۍ)
-	90.24				Grand mean
-	8.43				CV %
-	10.31				LSD _{0.05}

اتم جدول - د غنمو په بوټو کې د وږو اوږدوالی

د کنټرول سره یې توپیر	منځنۍ (سانتي متر)	د وږو اوږدوالی / سانتي متر			تريټمنټ
		درېیم تکرار	دویم تکرار	لومړی تکرار	
2	11.6	11	12	12	جوزجان 20 (اختیاري)
7.5	7.5	7.8	7.5	7.3	ډیورم 18 (اختیاري)
1.1	10.7	11.2	10	11	شرق 19 (اختیاري)
-2.3	7.3	7	8	7	دایمه 17 (اختیاري)
-0.9	8.7	9.6	8.7	8	گرمسیر 18 (اختیاري)
0.2	9.8	10	11	8.5	محلي (ژمنۍ)
2.9	12.5	12	13	12.5	شمال 17 (اختیاري)
3	12.6	13	14	11	نصرت 22 (اختیاري)
-	9.6	10	8	11	صلح 18 کنټرول (ژمنۍ)
1.7	11.3	10	13	11	پکتیا 20 (اختیاري)
3.4	13	13.5	11.5	14	کمر 20 (اختیاري)
-0.9	8.7	6.2	10	10	محلي 1 (ژمنۍ)
-	10.34				Grand mean
-	7.49				CV %
-	1.31				LSD _{0.05}



د پام وړ توپیر	توپیر (سانتي متر)	پرتله شوي جینوټایپونه
شته	5.7	کنډ 20 X دایمه 17
شته	5.5	کنډ 20 X ډیورم 18
شته	5.3	نصرت 22 X دایمه 17
شته	2.7	شمال 17 X محلي
شته	3.4	شرق 19 X دایمه 17
نشته	0.2	محلي X صلح 18
نشته	0	محلي 1 X گرمسیر 18

نهم جدول - د حاصل تر پخېدو پورې د ورځو شمېر

تریتمنت	تر پخېدو د ورځو شمېر	د کنترول سره یې توپیر
جوزجان 20 (اختیاري)	145	0
ډیورم 18 (اختیاري)	145	0
شرق 19 (اختیاري)	141	- 4
دایمه 17 (اختیاري)	144	- 1
گرمسیر 18 (اختیاري)	144	- 1
محلي (ژمنی)	140	- 5
شمال 17 (اختیاري)	140	- 5
نصرت 22 (اختیاري)	139	- 6
صلح 18 کنترول (ژمنی)	145	-
پکتیا 20 (اختیاري)	144	- 1
کنر 20 (اختیاري)	144	- 1
محلي 1 (ژمنی)	141	- 4
Grand mean	142.4	-
CV %	0.70	-
LSD _{0.05}	1.70	-



پرتله شوي جینوټایپونه	توپیر (ورځې)	د پام وړ توپیر
نصرت 22 X صلح 18	- 6	شته
شمال 17 X صلح 18	- 5	شته
محلي X صلح 18	- 5	شته
شرق 19 X صلح 18	- 4	شته
محلي 1 X نصرت 22	2	شته
دایمه 17 X نصرت 22	5	شته

لسم جدول - په پلاټ کې د غنمو بېولوژيکي وزن



د پام وړ توپیر	توپیر (گرام)	پرتله شوي جینوټایپونه
شته	290.95	پکتیا 20 X دایمه 17
شته	234.09	ډیورم 18 X دایمه 17
شته	268.85	شرق 19 X دایمه 17
شته	218.85	شمال 17 X دایمه 17
شته	82.40	گرمسیر 18 X محلي
شته	284.51	کنړ 20 X دایمه 17
نشته	- 46.41	دایمه 17 X محلي 1
نشته	- 5.2	محلي 1 X محلي 1

د کنټرول سره يې توپیر	په في متر مربع کې بېولوژيکي وزن	منځنۍ	په پلاټ د غنمو د بوټو بېولوژيکي وزن/گرام			تريټمنټ
			درېيم تکرار	دویم تکرار	لومړی تکرار	
- 126.7	582.8	2040	2400	1730	1990	جوزجان 20 (اختیاري)
44.78	754.28	2640	2330	3250	2340	ډیورم 18 (اختیاري)
79.54	789.04	2761.6	2665	2930	2690	شرق 19 (اختیاري)
- 189.31	520.19	1820.6	1785	1962	1715	دایمه 17 (اختیاري)
- 65.7	643.8	2253.3	2645	1990	2125	گرمسیر 18 (اختیاري)
- 148.1	561.4	1965	1695	2240	1960	محلي (ژمنۍ)
29.54	739.04	2586.6	2830	2400	2530	شمال 17 (اختیاري)
229.54	939.04	3286.6	3570	2900	3390	نصرت 22 (اختیاري)
-	709.5	2483.3	2600	2230	2620	صلح 18 کنټرول (ژمنۍ)
101.64	811.14	2839	2966	3121	2430	پکتیا 20 (اختیاري)
95.2	804.7	2816.6	2930	2700	2820	کنړ 20 (اختیاري)
- 142.9	566.6	1983.3	2380	1870	1700	محلي 1 (ژمنۍ)
-	704.1					Grand mean
-	5.86					CV %
-	53.84					LSD _{0.05}

یوولسم جدول - د غنمو د وړو وزن



د پام وړ توپیر	توپیر (گرام)	پرتله شوي جینوټایپونه
شته	3.03	کنړ 20 X محلي 1
شته	2.77	کنړ 20 X گرمسیر 18
شته	2.7	کنړ 20 X پکتیا 20
شته	1.43	دایمه 17 X گرمسیر 18
شته	1.6	دایمه 17 X محلي 1
نشته	- 0.54	گرمسیر 18 X محلي
نشته	0.56	ډیورم 18 X نصرت 22
شته	0.70	شرق 19 X صلح 18

توپیر کنترول سره یې	منځنۍ/گرام	د وړي وزن/گرام			تربیمنت
		درېیم تکرار	دویم تکرار	لومړی تکرار	
0.96	3.16	1.9	3.4	4.2	جوزجان 20 (اختیاري)
0.96	3.16	2.1	2.9	4.5	ډیورم 18 (اختیاري)
0.7	2.9	3.7	2.1	2.9	شرق 19 (اختیاري)
1.2	3.4	2.8	4	3.4	دایمه 17 (اختیاري)
- 0.14	2.06	2.2	2.6	1.4	گرمسیر 18 (اختیاري)
0.4	2.6	2	3.1	2.8	محلي (ژمنۍ)
0.3	2.5	2.3	2.4	2.8	شمال 17 (اختیاري)
0.4	2.6	1.1	3.9	2.9	نصرت 22 (اختیاري)
-	2.2	1.4	2.5	2.7	صلح 18 کنترول (ژمنۍ)
- 0.07	2.13	2.7	3.5	3	پکتیا 20 (اختیاري)
2.63	4.83	3.8	5.4	5.3	کنړ 20 (اختیاري)
- 0.4	1.8	1.1	1.4	2.9	محلي 1 (ژمنۍ)
-	2.78				Grand mean
-	11.10				CV %
-	0.57				LSD _{0.05}

عوزجانه - حلی ۱ ، شاه ۱۴ ، قصیر ۱۵ - شرف ۱۶ - شرف ۱۷ - حلی - دایم ۱۹ ، کز ۲۰ ، کتیا ۲۱ ، صالح ۲۲ - جیم ۱۸

د کنترول سره یې توپیر	منځنۍ	په وږي کې د دانو شمېر/دانه			تريټمنټ
		درېیم تکرار	دویم تکرار	لومړی تکرار	
14.7	53.3	32	55	73	جوزجان 20 (اختیاري)
5.4	44	43	59	30	ډیورم 18 (اختیاري)
12.4	51	50	42	61	شرق 19 (اختیاري)
18	56.6	65	47	58	دایمه 17 (اختیاري)
11.73	50.33	38	56	57	گرمسیر 18 (اختیاري)
5.7	44.3	50	37	46	محلي (ژمنۍ)
0.73	39.33	45	36	37	شمال 17 (اختیاري)
11.4	50	61	39	50	نصرت 22 (اختیاري)
-	38.6	51	42	23	صلح 18 کنترول (ژمنۍ)
13.4	52	42	55	59	پکتیا 20 (اختیاري)
23.73	62.33	55	66	66	کنړ 20 (اختیاري)
- 3	35.6	48	33	26	محلي 1 (ژمنۍ)
-					Grand mean
-					CV %
-	4.43				LSD _{0.05}

ديارلسم جدول - د غنمو د 1000 دانو وزن



د پام وړ توپیر	توپیر (دانه)	پرتله شوي جینوټایپونه
شته	24.88	کنړ 20 X گرمسیر 18
شته	23.14	ډیورم 18 X گرمسیر 18
شته	16.08	کنړ 20 X صلح 18
شته	13.32	گرمسیر 18 X شرق 19
شته	11.56	کنړ 20 X شرق 19
شته	15.47	نصرت 22 X گرمسیر 18
شته	16.16	دایمه 17 X گرمسیر 18
شته	16.57	محلي 1 X گرمسیر 18
نشته	- 0.2	شمال 17 X محلي
نشته	- 0.37	پکتیا 20 X نصرت 22

جینوټایپ	د 1000 دانو منځنی وزن/گرم	د کنترول سره یې توپیر
جوزجان 20 (اختیاري)	45	7.07
ډیورم 18 (اختیاري)	52.27	14.34
شرق 19 (اختیاري)	42.45	4.52
دایمه 17 (اختیاري)	45.29	7.36
گرمسیر 18 (اختیاري)	29.13	- 8.8
محلي (ژمنی)	45.11	7.18
شمال 17 (اختیاري)	44.9	6.26
نصرت 22 (اختیاري)	44.6	6.67
صلح 18 کنترول (ژمنی)	37.93	-
پکتیا 20 (اختیاري)	44.23	6.3
کنړ 20 (اختیاري)	54.01	16.08
محلي 1 (ژمنی)	45.7	7.77
Grand mean	44.15	-
CV %	4.2	-
LSD _{0.05}	2.43	-

ځوارلسم جدول - د حاصل کچه



د پام وړ توپیر	توپیر (دانه)	پرتله شوي جينوتايپونه
شته	1.48	نصرت 22 X محلي 1
شته	1.31	پکتيا 20 X دايمه 17
شته	1.44	کنړ 20 X گرمسير 18
شته	0.43	شرق 19 X محلي
شته	- 1.19	ډيورم 18 X نصرت 22
شته	- 1.28	صلح 18 X نصرت 22
شته	- 1.19	جوزجان 20 X نصرت 22
نشته	- 0.13	دايمه 17 X گرمسير 18
نشته	0.07	محلي X شمال 17

په پلاټ کې د حاصل کچه/گرام	په پلاټ کې د حاصل منځنۍ کچه / گرام			په هکتار کې د حاصل کچه/ټن		تريټمنټ
	لومړی تکرار	دویم تکرار	درېیم تکرار	کچه/ټن	متر مربع کې د حاصل کچه/گرام	
1075	1020	1105	1066.6	333.31	3.33	جوزجان 20 (اختياري)
989	1015	1128	1044	298.28	2.89	ډيورم 18 (اختياري)
1123	1098	1150	1123.6	321.04	3.21	شرق 19 (اختياري)
816	850	912	859.3	245.5	2.45	دايمه 17 (اختياري)
900	887	920	902.3	257.80	2.57	گرمسير 18 (اختياري)
1009	985	1050	973	278	2.78	محلي (ژمنۍ)
940	920	990	950	271.4	2.71	شمال 17 (اختياري)
1470	1450	1463	1461	417.42	4.17	نصرت 22 (اختياري)
1011	985	1045	1013.6	289.6	2.89	صلح 18 کنترول (ژمنۍ)
1305	1295	1340	1313.33	375.33	3.75	پکتيا 20 (اختياري)
1353	1436	1425	1404.6	401.33	4.01	کنړ 20 (اختياري)
980	890	960	943	269.4	2.69	محلي 1 (ژمنۍ)
					3.20	Grand mean
					5.34	CV %
					0.33	LSD _{0.05}

پنځلسم جدول - د غنمو د جینوټایپونو د هارویست انډکس سلنه

تريتمنونه	په متر مربع کې د غنمو حاصل/گرام	په متر مربع کې بیولوژیکي وزن/گرام	د هارویست انډکس فورمول	د هارویست انډکس سلنه
جوزجان 20 (اختیاري)	333.31	582.8	$\frac{\text{بیولوژیکي وزن}}{\text{حاصل}} \times 100 = \text{هارویست انډکس}$	57.19
ډیورم 18 (اختیاري)	298.28	754.28		39.5
شرق 19 (اختیاري)	321.04	789.04		40.6
دایمه 17 (اختیاري)	245.5	520.19		47.19
گرمسیر 18 (اختیاري)	257.80	643.8		40.04
محلي (ژمنی)	278	561.4		49.51
شمال 17 (اختیاري)	271.4	739.04		36.72
نصرت 22 (اختیاري)	417.42	939.04		44.4
صلح 18 کنترول (ژمنی)	289.6	709.5		40.81
پکتیا 20 (اختیاري)	375.33	811.14		46.27
کنر 20 (اختیاري)	401.33	804.7		49.8
محلي 1 (ژمنی)	269.4	566.6		47.5
Grand mean				45.1
CV %				6.19
LSD _{0.05}				4.54

پرتله شوي جینوټایپونه	توپیر (سلنه)	د پام وړ توپیر
جوزجان 20 X شمال 17	20.47	شته
جوزجان 20 X ډیورم 18	17.69	شته
جوزجان 20 X شرق 19	16.59	شته
جوزجان 20 X گرمسیر 18	17.15	شته
جوزجان 20 X صلح 18	16.38	شته
کنر 20 X شمال 17	13.08	شته
محلي 17 X شمال 17	12.79	شته
نصرت 22 X شرق 19	3.80	نشته
دایمه 17 X محلي	- 2.32	نشته
محلي 1 X دایمه 17	0.31	نشته

شپارسم جدول - د خپرنې اقتصادي اغېزمنتيا

د ورايتي نوم	د حاصل کچه ټن/هکتار	د بوسو کچه ټن/هکتار	په هکتار کې ټول لگښت	د يو من غنمو قيمت/افغانی	د يو من بوسو قيمت/افغانی	ناخالصه گټه	خالصه گټه	د اغېزمنتيا سلنه
جوزجان 20 (اختياري)	3.33	2.4	40800	170	70	104871.3	64071.3	61
ډيورم 18 (اختياري)	2.89	4.2				113071.7	72271.7	63.9
شرق 19 (اختياري)	3.21	4.69				124921.14	84121.14	67.33
دایمه 17 (اختياري)	2.45	3.07				90275	49475	54.80
گرمسير 18 (اختياري)	2.57	3.84				100900	60100	59.56
محلي (ژمنی)	2.78	2.83				95864.48	55064.48	57.43
شمال 17 (اختياري)	2.71	5.4				119896.18	79096.18	65.97
نصرت 22 (اختياري)	4.17	5.22				153490.3	112690.3	73.41
صلح 18 کنترول (ژمنی)	2.89	4.19				112101.6	71301.6	63.60
پکتيا 20 (اختياري)	3.75	4.35				134617.43	93817.43	69.69
کنر 20 (اختياري)	4.01	4.04				137807.78	97007.78	70.39
محلي 1 (ژمنی)	2.69	3.5				100732.2	59923.2	59.48



پایلی

1 - د ورايتي گانو په منځ کې تر ټولو لوړ د جرمنېشن سلنه (97.3، 94.6، 94.3، 90.6) په ترتيب سره شرق 19، دايمه 17، پکتيا 20، کنړ 20 ورايتي گانو رامنځته کړي وه او د جرمنېشن تر ټولو ټيټه سلنه (67.6) گرمسير 18 ورايتي ورکړی ده.

2 - په بوټو کې د ټيلرونو (د توليدي ځانگو شمېر) تر ټولو ډېر شمېر (13، 13، 11، 11) په ترتيب سره پکتيا 20، شمال 17، کنړ 20، نصرت 22 ورايتي گانو توليد کړي وو او د ټيلرونو لږ شمېر (7) محلي 1 ورايتي رامنځته کړی وه.

3 - په ورايتي گانو کې تر ټولو اوږده وږي (13، 12.6، 12.5، 11.6 سانتي متره) په ترتيب سره په کنړ 20، نصرت 22، شمال 17، جوزجان 20 ورايتي گانو رامنځته کړي وو، او تر ټولو لنډه وږي (7.3 سانتي متره) دايمه 17 ورايتي ورکړي.

ادامه ...

4 - تر ټولو ژر پخېدونکي ورايتي گانې نصرت 22 او محلي وې چې په ترتيب سره په (139 او 140 ورځو) کې تر پخېدو رسېدلې وې، ځنډ پخېدونکې ورايتي صلح 18 په چې په 145 ورځو کې تر پخېدو رسېدلې وه.

5 - د بيولوژيکي وزن له اړخه ښې ورايتي گانې چې په متر مربع کې يې ډېر بيولوژيکي وزن (939.04، 811.14، 804.7، 789.01 گرامه) په ترتيب سره له نصرت 22، پکتيا 20، کنړ 20، شرق 19 ورايتي گانو څخه رامنځته شوي او په متر مربع کې لږ بيولوژيکي وزن (561.4 گرامه) محلي ورايتي ورکړي وه.

6 - د ورايتي گانو په منځ کې کنړ 20، نصرت 22، دايمه 17 او جوزجان 20 ورايتي گانو اوږده وې (4.83، 3.6، 3.4 او 3.1 سانتي متره) توليد کړي وو.

7 - په وېرو کې د دانو ډېر شمېر (62.3، 56.6، 53.3، 52، 50، دانې) په ترتيب سره کنړ 20، دايمه 17، جوزجان 20، پکتيا 20 او نصرت 22 ورايتي گانو کې رامنځته شوي وه او په وېرو کې د دانو لږ شمېر (38.6 دانې) صلح 18 ورايتي ورکړي وه.

ادامه ...

8 - د کنړ 20، ډيورم 18، محلي 1، دايمه 17، نصرت 22 او گرمسير 18 ورايتي گانو د 1000 دانو وزن په ترتيب سره 54.01، 52.27، 45.7، 45.2، 44.6 او 29.13 گرامه وه.

9 - په ورايتي گانو کې لوړ حاصل ورکونکي ورايتي گاني نصرت 22، کنړ 20، پکتيا 20 او جوزجان 20 وې چې په ترتيب سره يې په هکتار کې (4.17، 4.01، 3.7، 3.33 ټنه) حاصل ورکړی و. تر ټولو لږ حاصل (2.45 ټنه پر هکتار) له دايمه 17 ورايتي څخه ترلاسه شوی دی.

10 - تر ټولو لوړ هارويست انډکس سلنه (د داني او وښو تناسب) له جوزجان 20، کنړ 20، محلي او دايمه ورايتي گانو څخه ترلاسه شوی چې په ترتيب سره (57.19، 49.8، 49.5 او 47.19 سلنه) دی. لږ هارويست انډکس سلنه (36.72 سلنه) شمال 17 ورايتي ورکړی دی.

11 - د محاسباتو په پايله کې څرگنده شوه چې لوړ اقتصادي اهميت لرونکي ورايتي گاني عبارت دي له نصرت 22، کنړ 20، پکتيا 20، شرق 19 چې په ترتيب سره په هکتار کې ورڅخه (112690.3، 97007.78، 93817.43 او 84121.14 افغانۍ) بدون له لگښتونو خالصه گټه ترلاسه شوې ده. تر ټولو ټيټ اقتصادي ارزښت لرونکي ورايتي دايمه 17 وه چې په هکتار کې يې خالصه گټه 49475 افغانۍ وه.

وړاندیزونه

1 - څرنګه چې د څېړنو پایلو وښودله چې د نصرت 22، کنړ 20 او پکتیا 20 ورايتي ګانو تر ټولو لوړ حاصل ورکړی او د ناروغیو او آفتونو په وړاندې مقاومي دي، بناءً د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته وړاندیز کېږي چې د یادو ورايتي ګانو بنيادي تخم تولید او د کرنیزو تخمونو د تولید شرکتونو ته دې ورکړي، ترڅو یې تصدیق شوی تخم تولید او د بزګرانو په واک کې ورکړي.

2 - د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته وړاندیز کېږي چې د غنمو د لوړ حاصله او د ناروغیو او آفتونو په وړاندې دې ځواکمنو ورايتي ګانو د اصلاح پروګرامونه دې لا ګړندي کړي، ترڅو د غنمو د تولید له اړخه هېواد تر ځان بسیاینې ورسېږي.

له پاملرنې مو نړۍ مننه