



د افغانستان اسلامي امارت
علومو اکاډمي
د طبیعي - تخنیکي علومو د برخې معاونیت
د کیمیا، بیولوژي او کرنې علومو مرکز
د کرنې انستیتوت



د علمي - څېړنیزې پروژې عنوان:

د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د ځینو اګروتخنیکي عملیو د اغېزو څېړنه

لیکوال: څېړنوال دوکتور شاهد الله ساپی
لارښود استاد: نومانند اکاډیمېسن دوکتور سکندر حسيني



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين

سریزه

لومړۍ څپرکۍ

شالید (د موضوع په اړه تېرې څېړنې)

دویم څپرکۍ

(عمومي معلومات)

درېیم څپرکۍ

(د څېړنې ارزونه، تحلیل او محاسبه)

د څېړنې میتودونه د څېړنې شرایط

څلورم څپرکۍ

(د څېړنې علمي او اقتصادي ارزښت)

پایلي

وړاندیزونه

ماخذونه

سریزه

□ نخود چې علمي نوم يې (*Cicer arietinum*) او د Leguminosae کورنۍ پورې اړه لري.

□ نخود خپله القاح کېدونکې ډای پلوئید یو کلن لیګومی نبات دی نخود د انسانانو او څارویو د تغذیې له پاره د پروتین یوه بډایه سرچینه ده چې د کم عاید لرونکو کورنیو په خوړو کې ورڅخه ډېره ګټه اخیستل کېږي.

□ په نړۍ کې شاوخوا 90 سلنه نخود په للمي ډول او یوازې 10 سلنه د اوبه خور تر شرایطو لاندې کرل کېږي په افغانستان کې نخود په پراخه پیمانه کرل کېږي چې کروندګر ترې هر کال په زړه پورې عواید ترلاسه کوي نخود د غلو دانو څخه وروسته خورا د اهمیت وړ حبوبات دي چې زیاتره د دانې په موخه کرل

کېږي

ادامه ...

□ نخود د حبوباتو د ډلې هغه نبات دی چې د پخوانیو زمانو راهیسې په آسیا او اروپا کې کرل کېږي او سویل لوېدیځه آسیا د یاد بوټي د پیدایش احتمالي سیمه ګڼل کېږي

□ د Akroid او Doughty د آندونو له مخې د نخودو د پیدایش اصلي ټاټوبی ختیځه مدیترانه ده او د Decandolle د آند له مخې نخود (chick pea) سانسکریت نوم لري او پر دې دلالت کوي چې د نخودو کرل د بل هر هېواد په پرتله په هندوستان کې اوږده مخینه لري .

□ په وروستیو کالونو کې نخود د افریقا او آسترلیا ګرمو سیمو ته هم لېږدول شوي دي خو په یادو سیمو کې دومره د اهمیت او ارزښت وړ نه دي .

ادامه ...

نخود 80% د خپلې اړتیا وړ نایتروجن د تثبیت د پروسې له امله پوره کوي او تر 140 کیلوگرامه نایتروجن په یو هکتار ځمکه کې ذخیره کوي. دا چې د نخودو ریشه په ځمکه کې ډیره ژوره وده کوي او د ځمکې لاندې اوبو څخه په ښه ډول گټه پورته کوي کولای شي چې د وچوبي په وړاندې مقاومت وکړي

نخود په دوه لویو ټولگيو چې Desi او Kabuli نومېږي وېشل کېږي. په نړۍ واله کچه په 2018 - 2017 زېږدیزو کلونو کې 16.2 میلیون متریک ټنه نخود تولید شوي دي چې په هکتار کې یې منځنۍ تولید 1.25 متریک ټنه ښودل شوی دی، له دې امله د نورو لیگومي نباتاتو په پرتله خورا د اهمیت وړ نبات گڼل شوی دی

ادامه ...

□ د افغانستان اقليمي شرايط د نخودو د روزنې او پالنې لپاره مساعد دي په افغانستان کې د نخودو کرکيله د يو اساسي او ستراتيژيک نبات په ډول نه ترسره کېږي يوازې پخوانۍ ورايتي گانې په عنعنوي ډول په پاشان ډول کرل کېږي.

□ دا خېړنه د شپږو کالونو په اوږدو کې له 1398 څخه تر 1404 هجري لمريز کال پورې ترسره شوې ده په دې خېړنه کې د نخودو په اړه د هېواد دننه او بهر د پوهانو خېړنو ته اشاره شوې ده همدارنگه د نخودو اړوند عمومي معلومات، د نخودو ډلبندي، د نخودو د بوټي بيولوژيکي خصوصيات، د گرکيلې له پاره اقليمي شرايط، د خاورې او د ساحې انتخاب او د تخم تيارول، د نخودو په کرونده کې د هرزه بوټو کنترول، د ناروغيو او حشراتو د مخنيوې لاري چارې، د حاصلاتو راټولول او زېرمه کول او نخودو غذايي ارزښت په اړه لازم معلومات وړاندې شوي دي

ادامه ...

□ سربېره پر دې په دې څېړنه کې د نخودو د بوټي ځيني اگروتخنکي عمليې، لکه د اوبه خور شمېر، د فاسفورس لرونکي سرې اندازه، د کرلو ډول او د رايروبيوم د استعمال او نه استعمال اغېزې تر څېړنې لاندې نيول شوي دي.

□ د څېړنې ميتودونه او شرايط او همدا راز د څېړنې ارزونه، تحليل او محاسبې تر سره شوي دي.

□ په پای کې د څېړنې علمي او اقتصادي ارزښت، پايلې، وړانديزونه او سرچينې ځای پر ځای شوي دي.

د خپرنې موخه:

□ دا چې نخود د پروتئينو يوه بډايه سرچينه ده او په غذايي صنعت کې ورڅخه پراخه ګټه پورته کېږي په نومړي بوټي باندې د اوبخور د بېلابېلو شمېرو، د کرنې د ډول د رايزوبيوم د استعمال او نه استعمال او فاسفورس لرونکې سرې د اندازې پرتليزه څېړنه او د هغوی له جملې څخه د مناسبو اګروتخنيکي عمليو په ګوته کول چې د ځمکې په في واحد کې د حاصلاتو د زياتوالي لامل کېږي د علمي څېړنيزې موضوع موخه ده.

د خپرنې مېرْمیت:

□ دا چې د هېواد کروندګر نخود په سنتي او عنعنوي ډول کري له يوې خوا په ځمکه کې د زيات ټخم او له بل پلوه د هرزه بوټو سره د مبارزې لارې چارې ستونزمنوي. همدارنګه نخود اوبو د ډېر استعمال پر وړاندې حساس دی او زياتې اوبه د نبات د گل مرحله اغېزمنوي د نخودو د بغلان 013 ورايتې پر وده او حاصلاتو باندې د اوبخور شمېر د رايزوبيوم د استعمال او نه استعمال، د فاسفورس لرونکې سرې بېلابېلې اندازې او د کرنې د ډول د اغېزو څېړنه يوه مېرْمه موضوع ده.

د خپرنې پوښتنې:

□ د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د اوبخوړ د بېلابېلو شمېرو اغېز تر کومه حده دی؟

□ د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د فاسفورس لرونکې سرې د بېلابېلو اندازو اغېز څومره دی؟

□ د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د کر ډول څومره اغېز لري؟

□ د نخودو پر ودې او حاصلاتو باندې د رايډوبيوم استعمال او نه استعمال څومره اغېز لري؟

شاليد

□ په 2006 او 2007 زېږديز کال کې N.M Tangwana او J.B.O Ogala د نخودو په درې Desi او خلورو Kabuli ورايتي گانو د سويلي افريقا د ليمپوپو په ولايت کې د ژمي او اوږي په موسمونو کې د نخودو د بوټو په درې تراکمونو (په متر مربع کې 20، 25، 35) کې څېړنه ترسره کړې له څېړنې ترلاسه شويو پايلو وښودله چې کلتیوارونو او د نباتاتو تراکم په بوټي کې د پليو په شمېر يوازي د ژمي په موسم کې اغېزه کړې وه .

□ د نخودو د اوږي په کښت کې د حاصلاتو کچه په هغو پلاتونو کې چې د بوټو تراکم يې زيات وه په هکتار کې يې 2149 کيلو گرامه حاصل او په هغو پلاتونو کې چې د بوټو د تراکم په کې لږ وه، په هکتار کې يې 1035 کيلو گرامه حاصلات توليد کړي وو.

ادامه ...

□ صابر محمد بدیني او د هغه ملگرو په 2012 - 2011 زېږدیزو کلونو کې په پاکستان کې د نخودو پر ودې او حاصلاتو باندې د فاسفورس د مختلفو اندازو ($F_1 = 36-00$, $F_2 = 36-15$, $F_3 = 36-25$, $F_4 = 36-35$, $F_5 =$) 36-55 اغېزې د نخودو په D.G 89 او D.G 92 ورايتي گانو باندې خپرلې دي .

□ د خپرنې پایلو وښودله خومره چې د فاسفورس اندازه زیاته شوې ده په موازي توگه ورسره د حاصلاتو په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی په هغو پلاټونو کې چې 55 کیلو گرامه پر هکتار فاسفورس استعمال شوی دی په هکتار کې یې د حاصل کچه 1.7 ټنه ښودل شوې ده.

ادامه ...

□ په 2015-2014 کلونو کې په ایتوپیا کې Girma Chala او Obsa د نخودو په ودې او حاصلاتو باندې د عضوي او غیر عضوي سرو اغېزې څېړلي دي.


□ پایلو وښودله چې په هکتار کې د نخودو لوړ حاصل 2712.2 کیلو گرامه او د وښو لوړ حاصل 10030 کیلو گرامه هغه تریتمنت چې د ورمي کمپوست مقدار په هکتار کې 1.75 ټنه او د فاسفورس مقدار په هکتار کې 50 کیلو گرامه وه، په لومړۍ درجه او هغه تریتمنت چې د نخودو د حاصل کچه په هکتار کې 2454.4 کیلو گرامه او د وښو حاصل یې په هکتار کې 9152 کیلو گرامه وه، په هکتار کې یوازې 100 کیلو گرامه فاسفورس کیمیاوي سره استعمال شوي وه .

عمومي معلومات

• د نخودو منشاء او جغرافيايي وېش

د نخودو اصلي مرکز د ترکيې سويل ختيځ دی چې د سوريې سره په پوله پروت دی. په نوموړې سيمه کې د نخودو د سيسر جنس درې وحشي ډولونه *C. bijugum*، *C. enchinosperrum* او *C. reticulatum* موندل شوي دي.

د نخودو هغه وحشي ډول دی چې د نخودو د اصلي ډولونو سره ورته والی لري. دا د اصلاح شوو نخودو د اجدادو په توګه ګڼل کېږي. د نخودو وحشي ډولونه په ايران، افغانستان، ترکيې او منځنۍ آسيا کې خورا زيات موندل کېږي. د نخودو ډولونه د بحر له سطحې څخه نيولې بيا تر 5000 m لوړوالي پورې کرل کېږي.



لومړی شکل - په مختلفو هېوادونو کې د نخودو د توليد کچه (2005 - 2007 زېږديز کال)

په افغانستان کې د نخودو کرنه

نخود له پخوا څخه د افغانستان د مهمو نباتي خوراكي توکو له ډلې شمېرل کېږي. افغانستان د نړۍ د نخودو د پيداښت له مهمو سيمو څخه گڼل کېږي، ځکه چې دا سيمه د وچ اقليم او مناسبو خاورې له امله د نخودو د کرنې لپاره ډېره مناسبه ده.

□ د کرنيزو سيمو ساحه (Cultivation Area)

د نخودو ټوله کرنيزه ساحه په افغانستان کې شاوخوا 35000 – 40000 هکتاره ده. په ډېره پيمانه په لاندينيو ولايتونو کې کرل کېږي: هرات، بغلان، کندز، تخار، بلخ، کابل، ننگرهار، لغمان، بدخشان.

□ د توليد وضعيت

افغانستان کې د نخودو کلنی توليد شاوخوا 50000 – 60000 ټنه اټکل کېږي.

د څېړنې ارزونه، تحلیل او محاسبه

1- د خېړنې میتود

د خېړنې ځای: د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت اړوند د بادام باغ په خېړنیز فارم.

❖ د خېړنې کالونه: 1398 – 1404، د کښت نېټه د وري د میاشتې 9، د حاصل راټولونه، سرطان 29.

❖ د خېړنې ډول: ساحوي (Field Experiment)

❖ د خېړنې میتود: کاملاً تصادفي فکتوریل سپلیټ پلاټ (Factorial Split Plot Randomized Complete Block Design)).



❖ د تریتمنتونو شمېر: 36

❖ د تکرارونو شمېر: 3

❖ د پلاټونو شمېر: 108

❖ ټوله خېړنیزه ساحه 1012 متر مربع

❖ د هر پلاټ اندازه 4 متر مربع

ادامه ...

د اوبه خور نېټې

د اوبه خور شمېرې							
				12 سرطان	10 حوزا	11 ثور	9 حمل
		20 سرطان	28 حوزا	10 حوزا	22 ثور	1 ثور	9 حمل
23 سرطان	8 سرطان	24 حوزا	10 حوزا	25 ثور	10 ثور	25 حمل	9 حمل

■ خالصه خېرنېزه ساحه 432 مترمربع.

■ د بوټو تر منځ واټن 10 سانتي متر.

■ د قطارونو تر منځ واټن 35 سانتي متر.

■ په پلاټ کې د تخم اندازه 25 گرام.

د خېرنې اصلي فکتورونه:

✓ د اوبه خور د شمېرو 3 لېولونه (4,6,8)

د خېرنې فرعي فکتورونه:

✓ د کرلو میتود 2 لېوله (پاشکي، قطاري)

✓ فاسفورس لرونکي کيمياوي سره 3 لېوله (40، 60، 80) کيلوگرام /هکتار 40 (کيلوگرام P_2O_5 =

86.95 کيلوگرام تريپل سوپر فاسفيت، 60 کيلوگرام P_2O_5 = 130 کيلوگرام تريپل سوپر فاسفيت، 80

کيلوگرام P_2O_5 = 173 کيلوگرام تريپل سوپر فاسفيت

رايزوبيوم 2 لېوله (رايزوبيوم سره، پرته له رايوبيوم)

ادامه ...



❖ په هر بلاک کې د اساسي فکتورونو شمېر 3

❖ په ټوله کرنیزه تجربه کې د اساسي فکتورونو شمېر 9

❖ په هر بلاک کې فرعي فکتورونه 36

❖ ټول فرعي فاکتورونه 108

❖ د خپرنې د ارقامو احصائیوي تحلیل او تجزیه د SPSS سافت ویر په

واسطه ترسره شوې ده.



2- د خپرنې شرایط

□ د خپرنيزې ساحې موقعيت:

□ طول البلد 69.11 درجې

□ عرض البلد 34.55 درجې

□ د بحر له سطحې څخه لوړوالی: 1840 متره

□ د خاورې pH: قلوي (7.86 – 8.06)

درېم جدول: د کر څخه د مخه د خاورې د نمونې ارزونه								
Organic matter	Organic Carbon	Soil analysis table					ولسوالی	ولایت
		Elements			EC	pH		
OM	OC	د جذب وړ فاسفورس	د جذب وړ نایتروجن	د جذب وړ نایتروجن AV- N%	MS/Cm			No
%	%	PPM	Kg/ha					
1.1	0.65	31.0	370.7	0.0489	0.157	8.38	بادام باغ	کابل 1

خلورم جدول - د کر څخه وروسته د خاورې د نمونې ارزونه


T-C	OM	P ₂ O ₅	A.N	T-N	EC	pH	ID - Sample	NO
%	%	ppm	Kg/ha	%	Ms/cm			
0.71	1.22	11.05	477.9	0.084	0.13	7.86	58104	1
0.59	1.01	4.12	428.1	0.063	0.115	7.86	58105	2
0.68	1.17	3.98	499.2	0.098	0.127	7.93	58106	3
0.71	1.22	3.18	448.0	0.070	0.116	8.00	58107	4
0.71	1.22	2.38	464.3	0.077	0.128	8.00	58108	5
0.79	1.17	1.63	477.9	0.084	0.32	8.06	58109	6

پنجم جدول - د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د خلور ځل اوبخور اغېزې

مشاهدات								اساسي پلاټونه	فرعي فکتورونه (ترېتمنونه)
هکټار کې حاصل/اټن	هارويست انډکس	مټر مربع کې بيولوژيکي وزن/گرام	وزن/گرام د سل دانو	کچه/گرام د حاصل مټر مربع کې	د دانو شمېر په بوټي کې	د پليو شمېر په بوټي کې	د بوټو شمېر مټر مربع کې		
1.34	31.67	424.33	28.67	134.33	28	21.33	16	خلور ځله اوبه خور	F 40 + B+R (T2)
1.63	36.67	448.00	31.33	163.67	27.67	22.00	20		F 60 + B+R (T4)
1.76	36.33	485.33	29.33	176.33	28.33	28.33	21		F 80 + B+R (T6)
1.69	37.33	560.33	28.00	1.69	32.67	28.00	17		F 40 + L+R (T8)
1.82	40.00	456.33	29.33	182.67	33.00	26.00	19		F 60 + L+R (T10)
1.79	37.67	600.00	28.00	226.33	34.67	28.67	23		F 80 + L+R (T12)
1.64	40.67	404.00	32.33	164.33	28.67	22.67	18		F 40 + L+N (T7)
1.66	33.67	494.33	32.00	166.67	24.00	24.00	21		F 60 + L+N (T9)
1.77	35.00	507.67	29.33	177.67	31.33	23.67	18		F 80 + L+N (T11)
1.60	33.67	476.67	30.00	160.67	27.33	24.33	20		F 40 + B+N (T1)
1.50	36.00	417.00	31.33	150.67	27.33	20.67	19		F 60 + B+N (T3)
1.53	37.67	408.33	29.33	153.67	26.33	23.33	20		F 80 + B+N (T5)
1.33	32.22	455.78	29.55	134.8	26.44	19.11	18		F 60 + B+N (T15) (کنترول)

شپڙم جدول - د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د شپږ ځل اوبخور اغېزې


مشاهدات								اساسي پلاټونه	فرعي فکتورونه (تریتمنتونه)
هکتار کې حاصل/تن	هاریوست انلېکس	پیلوژیکي متر مربع	وزن/گرام د سل دانو	کچه/گرام حاصل کې د متر مربع	شپږ کې د دانو په بوټي	شپږ کې د پیلو په بوټي	شپږ کې د بوټو متر مربع		
2.03	33.33	610.67	32.00	203.67	28.33	28.33	22.00	شپږ ځله اوبه خور	F 40 + B+R (T14)
2.32	35.00	668.33	29.33	232.33	37.00	27.67	21.67		F 60 + B+R (T16)
2.00	30.00	669.33	29.33	200.33	37.00	27.67	18.67		F 80 + B+R (T18)
1.72	30.00	573.00	32.67	172.00	27.00	24.00	20.00		F 40 + L+R (T20)
1.85	37.00	500.67	32.33	185.00	30.00	21.33	19.00		F 60 + L+R (T22)
2.82	38.33	751.33	33.00	282.67	44.00	33.00	20.00		F 80 + L+R (T24)
1.80	35.33	509.33	28.67	180.00	32.00	30.33	19.67		F 40 + L+N (T19)
1.94	31.67	614.67	29.33	194.67	39.33	37.00	17.00		F 60 + L+N (T21)
2.30	37.67	776.00	32.33	291.67	48.67	35.00	18.67		F 80 + L+N (T23)
2.18	38.00	574.67	31.33	218.33	39.00	29.33	18.33		F 40 + B+N (T13)
2.12	33.33	640.33	28.00	212.33	46.00	31.33	16.67		F 80 + B+N (T17)
1.33	32.22	455.78	29.55	134.8	26.44	19.11	18.11		F 60 + B+N (T15) (کنترول)



اتم شڪل: په هڪٽار کي د نخودو پر حاصل باندې د شپڙ ځله اوبخور د اغېزو گراف

اووم جدول - د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د اته ځله اوبخور اغېزې

مشاهدات								اساسي پلاټونه	فرعي فکتورونه (ترېتمنونه)
هکټار کي حاصل اتڼ	هارويست انډکس	بيولوژيکي متر مربع کي وزن/گرام	وزن/گرام د سل دانو	کچه/گرام حاصل متر مربع کي د	په بوټي کي د دانو شمېر	په بوټي کي د پليو شمېر	متر مربع کي د بوټو شمېر		
2.73	36.67	754.00	30.00	273.33	46.00	33.00	19.33	اته ځله اوبه خور	F 40 + B+R (T26)
2.46	34.00	717.67	36.00	246.33	36.67	31.00	18.67		F 60 + B+R (T28)
2.20	36.00	511.67	28.00	00.220	37.00	33.00	17.33		F 80 + B+R (T30)
2.83	32.00	907.33	30.67	283.00	64.00	32.67	20.00		F 40 + L+R (T32)
2.84	37.67	756.00	32.67	284.33	33.47	33.67	19.00		F 60 + L+R (T34)
2.09	36.00	582.67	31.33	209.33	33.33	31.33	22.00		F 80 + L+R (T36)
2.03	33.33	608.67	29.33	203.00	31.67	28.00	19.00		F 40 + L+N (T31)
2.62	32.33	836.67	34.33	262.00	41.67	31.33	18.33		F 60 + L+N (T33)
2.73	35.33	774.00	34.67	273.33	42.33	31.67	19.33		F 80 + L+N (T35)
2.60	37.67	803.00	34.33	260.2	33.47	32.67	17.67		F 40 + B+N (T25)
2.23	35.00	637.33	30.33	223.33	47.33	32.33	16.00		F 60 + B+N (T27)
2.96	33.00	896.67	29.33	296.00	47.67	37.67	21.33		F 80 + B+N (T29)
1.33	32.22	455.78	29.55	133.33	26.44	19.11	18.11		F 60 + B+N (T15) (کنترول)
8.1	10.41	18.77	6.08	10.37	12.99	14.11	10.009		CV
0.27	0.11	3.84	0.063	0.011	0.271	0.200	0.06		LSD



تريٽمنٽون

نهم شڪل: په هڪٽار ڪي د نخودو پر حاصل باندې د اته ځله اوبخور د اغېزو گراف

د نخودو د ودې او حاصلاتو لپاره د کر د مناسب ډول تعیینول

□ هغه تریتمنتونه چې د لاین په ډول کرل شوي دي د هغو په پرتله چې په پاشان ډول کرل شوي دي د مشاهداتو پایلې یې په لاندې ډول خلاصه کیدای شي. که 2 تریتمنت د 8 تریتمنت سره پرتله شي،

□ په متر مربع کې د نبات شمېر په 2 تریتمنت کې 16.33 او په 8 تریتمنت کې چې د لاین په ډول کرل شوي 17.00 ثبت شوی دی. همدا راز نور ټول مشاهدات لکه په بوټي کې د پليو شمېر، په بوټي کې د دانو شمېر، متر مربع کې د حاصل کچه، د سل دانو وزن، متر مربع کې بیولوژیکي وزن، هارویست انډیکس او په هکتار کې د حاصلاتو کچه د 2 تریتمنت په پرتله په 8 تریتمنت کې په زیاته کچه ثبت شوي دي.

د نخودو د ودې او حاصلاتو لپاره د رايږوبيوم د مناسب مقدار تعينول

□ په نخودو کې د رايږوبيوم (*Rhizobium*) بکتریا سره د تخم درملنه یوه مهمه مرحله ده چې د نایتروجن تثبیت لپاره ګټوره ده .

□ یو کیلوګرام نخودو تخم مو 150 ګرامه رايږوبيوم سره معامله کړ .

□ زمونږ په موندونو کې جوته شوه چې د رايږوبيوم استعمال په ځينو خاصو شرايطو کې مثبتې پایلې لرلې دي . هغه تريتمنتونه چې اته ځلي اوبه شوي دي تر ټولو زیات حاصل 2.9 ټنه/هکتار کې په 29 تريتمنت کې ثبت شوی دی چې د فاسفورس لرونکې سرې مقدار یې 80 کیلوګرام/هکتار، د کرلو ډول یې لاین او د رايږوبيوم سره نه دی معامله شوی .

ادامه ...

□ هغه تریتمنتونه چې شیر ځلې اوبه شوي دي تر ټولو زیات حاصل 2.30 ټنه / هکتار کې په 23 تریتمنت کې ثبت شوی دی چې د فاسفورس لرونکي سرې مقدار یې 80 کیلوگرام / هکتار، د کرلو ډول یې لاین او د رایزوبیوم سره معامله شوی دی.

□ ویلای شو چې زموږ په موندنو کې د رایزوبیوم استعمال په ځینو ځانګړو تریتمنتونو کې د پام وړ اغېزې درلودلې دي او ورسره د حاصلاتو په کچه کې زیاتوالی رامنځته شوی دی، خو په ځینو نورو تریتمنتونو کې د رایزوبیوم استعمال د حاصلاتو په زیاتوالی کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راوستی.

د څېړنې اقتصادي ارزښت

دولسم جدول - په څلور ځله اوبه خور کې د څېړنې اقتصادي ارزښت

د اوبه خور شمېر	ترتمنتونه	حاصل ټن/هکتار	د في کيلو قيمت/افغانی	ناخالصه گټه/افغانی	په هکتار کې لگښت/افغانی	خالصه گټه/افغانی	د اغېزمنتيا سلنه
څلور ځله	F 40 + B+R (T2)	1.12	60	67200	36358	30840	45.89
	F 60 + B+R (T4)	1.43		85800	38437	47363	55.20
	F 80 + B+R (T6)	1.39		83400	40201	43199	51.79
	F 40 + L+R (T8)	1.50		90000	36700	53300	59.22
	F 60 + L+R (T10)	1.35		81000	38365	42635	52.63
	F 80 + L+R (T12)	1.79		107400	40561	66839	62.33
	F 40 + L+N (T7)	1.40		84000	36010	47990	57.13
	F 60 + L+N (T9)	1.40		84000	37810	46190	54.98
	F 80 + L+N (T11)	1.53		91800	37727	54073	58.90
	F 40 + B+N (T1)	1.20		72000	35830	36180	50.25
	F 60 + B+N (T3)	1.33		79800	37747	42053	52.69
	F 80 + B+N (T5)	1.40		84000	39610	44390	52.84
شپږ ځله	Check	1.33		79800	45485	34615	43.37

ديارلسم جدول - په شپږ ځله اوبه خور کې د څېړنې اقتصادي ارزښت

د اوبه خور شمېر	ترتمنونه	حاصل ټن / هکتار	د في کيلو قيمت / افغانۍ	ناخالصه گټه / افغانۍ	په هکتار کې لگښت / افغانۍ	خالصه گټه / افغانۍ	د اغېزمنتيا سلنه
شپږ ځله	F 40 + B+R (T14)	1.74	60	104400	43916	60484	57.93
	F 60 + B+R (T16)	2.06		123600	46004	77596	62.77
	F 80 + B+R (T18)	2.14		128400	47876	80524	62.71
	F 40 + L+R (T20)	1.59		95400	43781	51619	54.10
	F 60 + L+R (T22)	1.57		94200	45563	48637	51.63
	F 80 + L+R (T24)	2.10		126000	48056	77944	61.86
	F 40 + L+N (T19)	1.52		91200	43121	48079	52.71
	F 60 + L+N (T21)	1.76		75600	44684	30916	40.89
	F 80 + L+N (T23)	2.30		138000	47699	90301	65.00
	F 40 + B+N (T13)	1.89		113400	43451	69949	61.69
	F 80 + B+N (T17)	2.05		123000	47501	75499	61.38
	Check	1.33		79800	45485	34615	43.37

څوارلسم جدول - په اټه ځله اوبه خور کې د څېړنې اقتصادي ارزښت

د اوبه خور شمېر	ترتمتونه	حاصل ټن/هکتار	د في کيلو قيمت/افغانی	ناخالصه گټه/افغانی	په هکتار کې لگښت/افغانی	خالصه گټه/افغانی	د اغېزمنتيا سلنه
اټه ځله	F 40 + B+R (T26)	2.65	60	159000	51735	107265	67.46
	F 60 + B+R (T28)	2.77		166200	53643	112557	67.72
	F 80 + B+R (T30)	2.81		168600	55479	113121	67.09
	F 40 + L+R (T32)	2.78		166800	51852	114948	66.91
	F 60 + L+R (T34)	2.83		169800	53697	116103	68.37
	F 80 + L+R (T36)	2.46		144000	55164	88836	61.69
	F 40 + L+N (T31)	2.23		133800	50757	83043	62.06
	F 60 + L+N (T33)	2.80		168000	53070	114930	68.41
	F 80 + L+N (T35)	2.71		162600	54789	107811	66.55
	F 40 + B+N (T25)	2.2		132000	50730	81270	61.56
	F 60 + B+N (T27)	2.27		136200	52593	83607	61.38
	F 80 + L+N (T29)	2.96		177600	55521	122079	68.73
	Check	1.33		79800	45485	34615	43.37

پنځلسم جدول - د وده ايز فصل په دوران کې د نصب شوی نایتروجن کچه

د وده ايز فصل په دوران کې د نصب شوی نایتروجن کچه	فی کیلو گرام یوریا قیمت	مجموع قیمت
95.2 کیلو گرام / هکتار، د 207 کیلوگرام یوریا معادل	30	6210

زمونږ څېړنو دا وښودله چې نخودو د خپل وده ايز پړاو په موده کې 95.2 کیلو گرامه نایتروجن چې د 207 کیلو گرامه یوریا معادل دی په یوه هکتار ځمکه کې تثبیت کړی دی، که چېرته د فی کیلو گرام یوریا قیمت 30 افغانۍ وی، نو له دې درکه بزگر ته چې په خپله کرونده کې نخود کړي 6210 افغانۍ غیر محسوسه گټه رسېږي. بزگر کولای شي چې د راتلونکي نبات د یوریا اړتیاوو ته په کتو سره نوموړی مقدار محاسبه او د یوریا له استعمال څخه ډډه او یا یې مقدار کم کړي.

پایلی

1. په متر مربع کې د بوټو تر ټولو زیات شمېر 22.00 بوټي په 31 تریتمنت کې چې اته ځلي اوبه شوی دی ثبت شوي او د چک په پرتله چې په متر مربع کې یې د بوټو شمېر 18.11 دې زیات دی، نو ویلای شو چې اته ځلي اوبه خور او 31 تریتمنت یو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پایله کې یې په متر مربع کې د بوټو شمېر زیات شوی دی .

2. د سلو دانو تر ټولو زیات وزن 36 گرامه په 28 تریتمنت کې چې اته ځلي اوبه شوی دی د چک په پرتله چې د سلو دانو وزن یې 29.55 گرامه دی زیات دی، ویلای شو چې شپږ ځله اوبه خور او 28 تریتمنت تر منځ مثبتې اړیکې موجودې دي.

3. په بوټي کې د پليو تر ټولو زيات شمېر 37.67 پلې په 29 تريتمنت کې چې اته ځلي اوبه شوی دی ثبت شوی دی چې د چک په پرتله چې په بوټي کې د پليو شمېر 19.11 دی زيات دی. نو ويلاى شو چې اته ځلي اوبه خور او 29 تريتمنت يو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پايله کې يې په بوټي کې د پليو شمېر زيات شوی دی.

4. په بوټي کې د دانو تر ټولو زيات شمېر 47.67 په 29 تريتمنت کې درج شوی دی او د چک په پرتله چې د دانو شمېر يې 26.44 دانې کېږي زيات دی ويلاى شو چې اته ځلي اوبه خور او 29 تريتمنت يو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پايله کې يې په بوټي کې د دانو شمېر زيات شوی دی.

5. متر مربع کې د حاصل تر ټولو زياته کچه 296.00 گرامه په 29 تريتمنت کې درج شوې ده او د چک په پرتله چې د حاصل کچه يې 133.33 گرامه /متر مربع زيات دی، ويلاى شو چې اته ځلي اوبه خور او 29 تريتمنت يو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پايله کې يې په بوټي کې د دانو شمېر زيات شوی دی.

6. متر مربع کې تر ټولو زیات بیولوژیکي وزن 907.33 گرامه په 32 تریتمنت کې چې د چک په پرتله چې بیولوژیکي وزن یې 455.87 گرامه په متر مربع کې دی زیات دی او دا جوتوی چې اته ځلي اوبه خور او 32 تریتمنت یو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پایله کې یې په متر مربع کې د نبات بیولوژیکي وزن زیات شوی دی .

7. تر ټولو زیاته د هارویست اندیکس سلنه 37.67 په 34 تریتمنت کې درج شوې ده چې د چک په پرتله چې د هارویست اندیکس سلنه 32.22 ده زیاته ده په ډاگه کوي چې اته ځلي اوبه خور او 34 تریتمنت یو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پایله کې یې د هارویست اندیکس سلنه زیاته شوې ده .

8. د حاصل کچه په هکتار کې 29 تریتمنت کې 2.96 ټن /هکتار کې ښودل شوې ده، په داسې حال کې چې د چک حاصل په هکتار کې 1.33 ټنه محاسبه شوی دی د 29 تریتمنت د حاصل کچه د چک په پرتله زیاته ده، په ډاگه کوی چې اته ځلي اوبه خور او 29 تریتمنت یو پر بل باندې مثبتې اغېزې لري چې په پایله کې یې د حاصلاتو کچه په هکتار کې زیاته شوی ده.

9. هغه تریتمنتونه چې څلور ځلي اوبه شوي دي تر ټولو زیات حاصل 1.79 ټنه / هکتار کې په 12 تریتمنت کې ثبت شوی دی چې د فاسفورس لرونکې سرې مقدار یې 80 کیلوگرام /هکتار، د کرلو ډول یې لاین او د رایزوبیوم سره معامله شوی دی. د نوموړي تریتمنت خالصه گټه 66839 افغانۍ پر هکتار او د اغېزمنتوب کچه یې 62.33 سلنه ده. گورو چې اوبه یو ثابت فاکتور دی او د فاسفورس لرونکې سرې بېلابېلو نورمونو، د کرلو ډول او د رایزوبیوم استعمال خپلي اغېزې درلودلي دي.

10- هغه تریتمنتونه چې شیر ځلې اوبه شوي دي تر ټولو زیات حاصل 2.30 ټنه / هکتار کې په 23 تریتمنت کې ثبت شوی دی چې د فاسفیت لرونکي سرې مقدار یې 80 کیلوگرام / هکتار، د کرلو ډول یې لاین او د رایزوبیوم سره معامله شوی دی. د نوموړي تریتمنت خالصه گټه 138000 افغانۍ او د اغېزمنتوب کچه یې 65.00 سلنه ده چې د نورو ټولو تریتمنتونو په پرتله یې د حاصلاتو او اغېزمنتوب کچه زیاته ده. چک چې شیر ځلې اوبه شوی دی د حاصل کچه یې 1.33 ټنه/هکتار کې، خالصه گټه یې 34615 افغانۍ او د اغېزمنتوب سلنه یې 43.37 سلنه ده د 23 تریتمنت د حاصلاتو کچه 2.30 ټن/هکتار د چک په پرتله زیاته ده.

11- هغه تریتمنتونه چې اته ځلې اوبه شوي دي تر ټولو زیات حاصل 2.96 ټنه / هکتار کې په 29 تریتمنت کې ثبت شوی دی چې د فاسفورس لرونکېسې مقدار یې 80 کیلوگرام / هکتار، د کرلو ډول یې لاین او د رایزوبیوم سره نه دی معامله شوی. د نوموړي تریتمنت خالصه گټه 122079 افغانۍ او د اغېزمنتوب کچه یې 68.73 سلنه ده چې د نورو ټولو تریتمنتونو په پرتله یې د حاصلاتو او اغېزمنتوب کچه زیاته ده،

12- څېړنو دا وښودله چې نخودو د خپل ودېز پړاو په موده کې 95.2 کیلو گرامه نایتروجن چې د 207 کیلو گرامه یوریا معادل دی په خاوره کې تثبیت کړی دی که چېرته د في کیلو گرام یوریا قیمت 30 افغانۍ وی، نو له دي درکه بزگر ته چې په خپله کرونده کې نخود کړي 6210 افغانۍ غیر محسوسه گټه رسیږي. بزگر کولای شي چې د راتلونکي نبات د یوریا اړتیاوو ته په کتو سره نوموړی مقدار محاسبه او د یوریا له استعمال څخه ډډه او یا یې مقدار کم کړي.

وړاندیزونه

□ د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت ته وړاندېزکېږي چې د خپلو ترويجي يونټونو له لارې هغو بزگرانو ته چې په خپلو کروندو کې نخود کړي د اته ځل اوبه خور وړاندیز وکړي، ترڅو د قناعت وړ حاصل تر لاسه کړي.

□ په هغو ځايونو کې چې بزگران د اوبو د کمښت سره مخامخ دي که د نخودو کروندې شپږ ځلي اوبه کړي هم د قناعت وړ حاصل تر لاسه کولای شي. لکه زمونږ په موندونو کې 23، 12 او 24 تريتمنتونو کې.

□ د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت ته وړاندېزکېږي چې د خپلو ترويجي يونټونو له لارې بزگران و پوهوي چې د نخودو نبات په کرنيز تناوب کې شامل کړي.

□ د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت ته وړاندیز کېږي چې د خپلو ترويجي يونټونو له لارې بزگران وپوهوي چې د نخودو په کروندو کې 80 کيلو گرامه خالصه فاسفورس لرونکې سره / هکتار کې استعمال کړي.

□ د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت ته وړاندیز کېږي چې د خپلو ترویجی یونټونو له لارې بزگران و پوهوي چې د نخودو کروندې د لاین په بڼه وکړي. لکه زموږ په موندنو کې 32، 33 او 35 تریتمتونه چې په دې بڼه کرل شوي دي.

□ دا چې زموږ په موندونو کې د رایزوبیوم استعمال او نه استعمال په حاصلاتو باندې کومې غوڅې او پریکنده پایلې نه درلودې، نو بزگران کولای شي چې د رایزوبیوم له استعمال څخه ډډه وکړي، ترڅو د اضافي لگښتونو څخه مخنیوی وشي.

□ دا چې نخود پروټینونو بڼه منبع ده او هم بڼه درملیزې ځانګړتیاوي او اقتصادي ارزښت لري، بناءً د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کیمیا، بیولوژي او کرنې علمي مرکز ته وړاندیز کېږي چې د دې بوټي د حاصلاتو د زیاتېدو، اګرونوميکي ځانګړتیاوو او اصلاحي پروګرامونو په اړه دې نورې څېړنې ترسره کړي.

له پاملرنې مو نړۍ مننه


یوولسم جدول - په هکتار کې د خپرنې لگښتونه افغانۍ پر هکتار

شماره	کرنیز عملیات	قیمت	مجموعه
1	د ځمکې قلمه کول /هکتار	3500	3500
2	هموار کاري /هکتار	1000	1000
3	په هکتار کې د 25 کیلو گرامه تخم ریز قیمت	2250	2250
4	فاسفیت لرونکي سره 40 کیلو گرام معادل د 86.6 کیلو گرام تراپیل سوپر فاسفیت	3600	3600
5	فاسفیت لرونکي سره د چک په شمول 60 کیلو گرام معادل 130 کیلو گرام تراپیل سوپر فاسفیت	5400	5400
6	فاسفیت لرونکي سره 80 کیلو گرام معادل د 173 کیلو گرام تراپیل سوپر فاسفیت	7200	7200
7	یوریا کیلو گرام	900	900
8	خیشاوه	7500	7500
9	6 ځلې اوبه خور چک / (هکتار	3500	21000
10	8 ځلې اوبه خور لوړ حاصله تریتمنت /هکتار	3500	28000
11	د حاصل ټولول	2000	2000
12	د یو تن حاصل پاک کاري	600	600
13	د لس کیلو متر په اساس د یو تن حاصل ترانسپورټیشن له مزرعې تر مارکیت	300	300
14	رایزوبیوم	600	600

اتم جدول - د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د فاسفورس لرونکېسري د بېلابېلو اندازو اغېزې

اساسي پلاټونه	فرعي فکتورونه (تريتمنتونه)	مشاهدات							
		شمبر کي د بوټو متر مربع	شمبر کي د پلو په بوټي	شمبر کي د دانو په بوټي	کچه/گرام حاصل کي د متر مربع	وزن/گرام د سل دانو	وزن/گرام بيولوژيکي کي متر مربع	هارويست انلکس	هکتار کي حاصل اتڼ
څلور څله اوبه خور	F 40 + B+R (T2)	15.67	19.44	23.78	112.5	28.89	371.78	30.11	1.12
	F 60 + B+R (T4)	17.89	20.67	25.45	143.2	31.44	404.78	35.33	1.43
	F 80 + B+R (T6)	21.11	19.89	22.33	139.1	30.11	445.55	31.44	1.39
	F 40 + L+R (T8)	16.00	21.00	30.78	151.5	30.67	473.00	31.33	1.50
	F 60 + L+R (T10)	18.78	20.78	26.33	135.5	28.33	399.67	33.33	1.35
	F 80 + L+R (T12)	19.78	24.22	30.22	179.5	30.00	532.33	33.67	1.79
	F 40 + L+N (T7)	17.78	21.11	25.67	140.1	30.22	392.67	35.11	1.40
	F 60 + L+N (T9)	20.22	19.67	23.00	140.5	30.78	465.89	29.89	1.40
	F 80 + L+N (T11)	19.22	22.22	26.67	153.6	29.11	473.22	32.78	1.53
	F 40 + B+N (T1)	17.11	21.44	23.78	120.5	29.22	385.33	30.89	1.20
	F 60 + B+N (T3)	18.11	19.11	26.44	134.8	29.55	455.78	32.22	1.33
	F 80 + B+N (T5)	20.33	19.33	23.55	140.4	29.22	443.78	32.00	1.40
	F 60 + B+N (T15)	19.11	29.11	35.33	215.8	31.78	717.44	30.22	1.33






ٽريٽمنٽونه

لسم شڪل: ٻه هڪٽار کي د نخودو ٻوڙ حاصل باندې د فاسفورس لرونڪي ٻوڙ د اغيزو گراف

لسم جدول - د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د فاسفورس لرونکېسري د بېلابېلو اندازو اغېزې

مشاهدات								اساسي پلاټونه	فرعي فکتورونه (تریتمنتونه)
هکتار کې حاصل اتڼ	هاریکس انډیکس	بیولوژیکي وزن/گرام متر مربع	وزن/گرام د سل دانو	کچه/گرام حاصل کې د متر مربع	په بوټي کې د دانو شمېر	په پیلو شمېر کې	کې د بوټو متر مربع شمېر		
1.52	32.78	448.55	29.11	152.6	27.22	35.11	18.78	څلور ځله اوبه خور	F 40 + B+R (T26)
1.76	30.78	572.11	30.00	176.1	35.11	36.67	18.11		F 60 + B+R (T28)
2.61	38.11	691.33	32.33	262.4	48.78	38.78	18.89		F 80 + B+R (T30)
1.89	35.44	532.11	31.44	189.5	34.56	35.33	19.11		F 40 + L+R (T32)
2.15	30.22	717.44	31.78	215.8	35.33	36.67	18.22		F 60 + L+R (T34)
2.39	33.89	711.22	28.67	239.7	48.22	39.33	19.67		F 80 + L+R (T36)
2.65	32.34	847.89	30.22	265.2	46.67	33.11	18.67		F 40 + L+N (T31)
2.77	34.22	809.44	34.00	276.7	46.78	36.56	20.00		F 60 + L+N (T33)
2.81	36.78	763.78	30.44	281.5	48.55	40.78	17.78		F 80 + L+N (T35)
2.78	35.56	839.44	31.45	278.6	49.22	35.22	16.22		F 40 + B+N (T25)
2.83	37.22	769.78	32.22	282.7	50.67	30.55	18.44		F 60 + B+N (T27)
2.46	36.55	917.67	32.67	246.1	50.44	40.00	21.11		F 80 + B+N (T29)
1.33	32.22	455.78	29.55	134.8	26.44	19.11	18.11		F 60 + B+N (T15) (کنترول)



تريتمنتونه

يوولسم شکل: په هکتار کې د نخودو پر حاصل باندې د فاسفورس لرونکېسري د اغېزو گراف